

THL:n taulukko eri ryhmille tarjottavista rokoteannoksista ja suositelluista rokoteväleistä, 11.3.22

Rokotteen ja koronavirustartunnan aikavälin on oltava vähintään 6 viikkoa, jotta tartunnan voidaan katsoa vastaavan yhtä rokoteannosta. Kahden tartunnan välisen ajan tulee olla 3 kuukautta, jotta niitä voidaan pitää varmuudella erillisinä tartuntoina.

Taulukossa esitetyt rokotusten aikavälit voivat olla myös pidempiä. Kun rokoteannosten tai tartunnan ja rokottamisen aikaväli on riittävän pitkä, muodostuva immuunivaste on laadullisesti ja määrällisesti parempi ja suojateho pitkäkestoisempi.

Ryhmä	Ei koronavirus tartuntaa	Koronavirustartunta	1 rokote + koronavirustartunta	2 rokotetta + koronavirustartunta
5–11-vuotiaat voimakkaasti immuunipuutteiset	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Ei vielä suositella kolmatta rokotetta	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Ei vielä suositella toista rokotetta	Ei vielä suositella toista rokotetta	Ei vielä suositella kolmatta rokotetta
muut 5–11-vuotiaat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä	Ensimmäinen rokote 4–6 kk tartunnasta	Ei tarvetta toiselle rokotteelle	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle
12 vuotta täyttäneet voimakkaasti immuunipuutteiset	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Kolmas rokote aikaisintaan 2 kk toisen annoksen jälkeen Neljäs rokote 3–4 kk kolmannen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta Toinen rokote aikaisintaan 2 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen Kolmas rokote 3–4 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokotteesta Kolmas rokote 3–4 kk toisen rokoteannoksen/ tartunnan jälkeen	Kolmas rokote 3–4 kk tartunnasta/ toisesta rokoteannoksesta Ei tarvetta neljännelle rokotteelle
muihin riskiryhmiin kuuluvat 12–17-vuotiaat	Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä Kolmas rokote 6 kk toisen rokoteannoksen jälkeen	Ensimmäinen rokote 4–6 kk tartunnasta Toinen rokote 6 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen	Toinen rokote 6 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokotteesta	Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle

Ryhmä	Ei koronavirus tartuntaa	Koronavirustartunta	1 rokote + koronavirustartunta	2 rokotetta + koronavirustartunta
muut 12–17-vuotiaat	<p>Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä</p> <p>Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle, mutta voi ottaa 6 kk toisen rokoteannoksen jälkeen</p>	<p>Ensimmäinen rokote 4–6 kk tartunnasta</p> <p>Ei tarvetta toiselle rokotteelle, mutta voi ottaa 6 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen</p>	<p>Ei tarvetta toiselle rokotteelle, mutta voi ottaa 6 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokotteesta</p>	<p>Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle</p>
yli 60-vuotiaat ja 18 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat	<p>Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä</p> <p>Kolmas rokote 3–4 kk toisen rokoteannoksen jälkeen</p>	<p>Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta</p> <p>Toinen rokote 3–4 kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen</p>	<p>Toinen rokote 3–4 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokotteesta</p>	<p>Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle</p>
muut 18–59-vuotiaat	<p>Kaksi rokotetta 6–12 viikon annosvälillä</p> <p>Kolmas rokote 4–6 kk toisen rokoteannoksen jälkeen</p>	<p>Ensimmäinen rokote aikaisintaan 2 kk tartunnasta</p> <p>Toinen rokote 4–6kk ensimmäisen rokoteannoksen jälkeen</p>	<p>Toinen rokote 4–6 kk tartunnasta/ ensimmäisestä rokotteesta</p>	<p>Ei tarvetta kolmannelle rokotteelle</p>